


Succesraten ved SPF saneringer

Poul Moesgaard Jensen
Seniordyrlæge
SPF-Sundhedsstyringen

Avlspyramide = sundhedspyramide






Saneringsmåder

- Totalsanering
- Delsanering
 - PRRS
 - Mycoplasma-lungesyge
 - Dysenteri
 - Ondartet lungesyge (Ap2)



Godkendelser






- Totalsaneringer / nygodkendelse**

- Grudlaget for hele SPF-systemet
- Hvis der er rent, er det 100 % sikkert
- Tag hensyn til naboers sundhedsstatus
- Saneringsmanagement på INFO SVIN



- ## Delsanering

- Schweiser-saneringer
- Ændret en del igennem tiden (forsøg)
 - Faringsstop / Ingen faringsstop
 - Dyr over 10 måneder / ungdyr i besætningen
 - Medicinering / ikke medicinering
- For mange kompromisser sænker succesraten



SWS

PRRS

- Skal besætningen holdes PRRS-smittet eller skal den delsaneres ?
- Lav blodprøver til screening
- Mange spontane saneringer
 - Svært at holde gang i smitten i sobesætninger med 7 kg produktion eller med konsekvent sektioneret drift i klimastalde.
 - OBS polteindtag i besætningen

SWS

PRRS

- Delsanering - aktive handlinger
 - Konsekvent sektioneret drift
 - Tømning af stalde med kontinuerligt drift
 - Indkøb af PRRS-negative polte
 - Evt. vaccination i karantænerum og lang karantæneperiode
- Kun få saneringer mislykkes.
 - SPF-Sundhedsstyringen får dog ikke besked om alle de saneringer som laves
- Mange ungdyr i besætningen mindsker succesraten.

SWS

Mycoplasma

- Faringsstop (ikke ret mange)
- Medicinering af pattegrise
- Ungdyr ned til 8½-9 måneder
- Ungdyr i alle aldersgrupper
- Spontane saneringer
 - 7 kg produktion + indkøb af negative polte
 - 30 kg produktion + indkøb af negative polte konsekvent sektionering
 - Stort interval mellem indsættelse af polte (> 3 måneder)

Mycoplasma

- Mislykkede saneringer i 2010:
 - Polte retur - flere gange medicinering (1+1)
 - Troede besætningen var negativ på 20 prøver – ingen kliniske tegn (3+1+2)
 - Langt indsættelsesstop – stop for poltevacc. (2)
 - Købt smitte ind i sobesætning (1)
 - Gensmitte – slagtesvinebesætning (1)
- Næsten alle saneringer med eller uden faringsstop lykkes, hvis der medicineres på klassisk vis og ungdyrene fjernes !!

Mycoplasma – egenproduktion af polte




Dysenteri

- Ved smitte med dysenteri bør besætningen saneres
- Slagtesvinebesætninger totalsaneres
- Medicinsk sanering af sobesætninger
 - Tiamulin
- 6 måneders kontrol (dyrt)
- Kan ikke huske, hvornår en dysentri-sanering mislykkedes => succesrate tæt på 100%

Ondartet lunge sygdom – Ap2

- Få medicinske saneringer
 - 25 afsluttede for Ap2 i 2009-2010
 - 13 slagtesvinebesætninger eller sobesætninger med smittet slagtesvinestald
 - 12 sobesætninger + evt. samdrifter
 - spontan sanering (2)
 - Har nok aldrig været inde i besætningen (2)
 - Nuflor (1)
 - Marbocyl eller Baytril (3+1+3)



Ondartet lungesygge

- Lav succesrate med de antibiotika vi har til rådighed
- Meget lang kontrolperiode i sobesætninger (2½-4 år)
 - sidste so ude inden blodprøve-kontrol
 - ➔ svært at sælge smågrise / avlsdyr i kontrolperioden
- Slagtesvinebesætninger
 - 3 x 20 blodprøver med 3 måneders mellemrum
 - Første prøvesæt 1 måned efter udsættelse af smittede

Skab og lus



- Succesrate tæt på 100 %
- **MAN HAR BARE IKKE SKAB ELLER LUS I EN BESÆTNING I 2010 !!!**
 - 2 smittede i SPF-systemets historie
 - 1 friland og 1 konventionel i grønt program

Konklusion

- Man skal overveje meget om der skal laves
 - Totalsanering eller
 - Delsanering
- Specielle kontrolprogrammer i sektionerede slagtesvinebesætninger
- OBS de spontane saneringer – primært PRRS
- Nogle delsaneringer en nemme
 - Intern logistik og sektionering
- *Pluk de frugter, som er nemmest at få fat i*
- SPF-SuS vil gerne være med på sidelinjen som sparring for dyrlægen

Spørgsmål

